



CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM EMPREGO
PÚBLICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
(FMS) – PARANÁ

CADERNO DE PROVAS

EMPREGO PÚBLICO

ENFERMEIRO - PSF



Antes de iniciar a prova, leia as instruções abaixo:

1. Espere a ordem do fiscal para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul.
4. A folha de respostas compõe-se de quadrículas. Para assinalá-las, basta preencher toda a quadrícula da questão escolhida, da seguinte forma: ■
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o Fiscal comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Coloque somente seu número de inscrição; não coloque seu nome nem na folha de respostas, nem nas provas.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova acompanhado do fiscal de corredor.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Use o verso da ficha de comprovação de inscrição, para copiar o gabarito de sua prova.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Os gabaritos estarão disponíveis no site da UniuV: www.uniuV.edu.br, no dia 27 de maio de 2009, a partir das 17h.
18. O resultado do concurso será publicado na Imprensa Oficial e estará disponível no site da UniuV e na Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, no dia 5 de junho de 2009.



1 - A Norma Operacional Básica – NOB nº 1/96, instrumento de regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- (A) Cria Comissão Intergestora Bipartite (de âmbito estadual) e a Comissão Intergestora Tripartite (de âmbito federal).
- (B) Reafirma o SUS, caracterizando-se por sua defesa e ampliação, sem interferir nas condições para a municipalização da saúde.
- (C) Retroage em relação à descentralização, aumentando as exigências para que os municípios se responsabilizem pela saúde dos cidadãos.
- (D) Cria o Piso Ambulatorial Básico – PAB, que permite a transferência direta, regular e automática, aos municípios, de recursos para procedimentos de atenção básica.
- (E) Cria o Programa de Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, inovando a atenção à saúde.

2 - O Código de Ética do Profissional de Enfermagem reúne normas, princípios, direitos e deveres pertinentes à conduta ética que deverá ser assumida pelos profissionais dessa área. A esse respeito, julgue os itens que se seguem.

- I O Profissional de enfermagem deve exercer sua profissão com autonomia, respeitando os limites estabelecidos pelos preceitos legais da enfermagem.
- II O Profissional de enfermagem deve-se responsabilizar por falta cometida em atividades de sua profissão, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.
- III É dever do profissional de enfermagem atualizar continuamente seus conhecimentos técnico-científicos e culturais.
- IV É direito do profissional alertar o colega responsável por falta cometida por imperícia, imprudência e negligência.
- V É de competência do Conselho Federal de Enfermagem a decisão relativa à pena de cassação do direito ao exercício profissional.

Estão certos apenas os itens:

- (A) I, II e IV;
- (B) I, II e V;
- (C) I, III e V;
- (D) II, III e IV;
- (E) III, IV e V.

3 - Como espaço de execução da estratégia de Saúde da Família, o nível municipal define a melhor adequação dos meios e condições operacionais. Uma das competências do PSF, em nível municipal, é:

- (A) Implantar o sistema de informações e avaliação da estratégia de Saúde da Família.
- (B) Promover intercâmbio de experiências entre os municípios de sua área de abrangência.
- (C) Identificar e estruturar parcerias com organizações governamentais e não governamentais.
- (D) Estabelecer normas e diretrizes que definam os princípios da estratégia do PSF.
- (E) Planejar, acompanhar e avaliar a implantação da estratégia de Saúde da Família em seu nível de abrangência.

4 - Compete ao Sistema Único de Saúde – SUS, entre outras atribuições:

- I Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunológicos, hemoderivados e outros insumos.
- II Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde.
- III Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- IV Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.



Está correto o apresentado em:

- (A) I, II, III, IV;
- (B) I, III e IV, apenas;
- (C) III e IV, apenas;
- (D) II e III, apenas;
- (E) I, apenas.

5 - A perda auditiva induzida por ruídos acomete indivíduos expostos a ruídos industriais ou explosivos altos e estão relacionados a lesão:

- (A) No ouvido externo;
- (B) No ouvido médio;
- (C) Na cóclea;
- (D) Na bigorna;
- (E) Nas vias auditivas centrais.

6 - Elizabeth Kubler Ross descreve os estágios experimentados por alguns pacientes nos momentos que antecedem à morte. Ao identificar o estágio de negação, no qual a pessoa não acredita que vai morrer, o enfermeiro deve:

- () Contradizer diretamente o paciente.
- () Manter uma comunicação franca com ele.
- () Orientar o paciente de que tudo acabará sem sofrimento.
- () Ouvir com atenção o desabafo realístico sobre a doença.

Marque F (falso) e V (verdadeiro) e assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) F, V, V e F
- (B) F, F, V e V
- (C) V, V, F e F
- (D) V, F, V e F
- (E) F, V, F e V

7 - Julgue os itens abaixo, relativos à administração de medicamentos.

- I Indica-se a via parenteral para a administração de medicamentos em casos de paciente inconsciente, com distúrbio gastrointestinal ou impossibilitado de deglutir.
- II Para a enfermagem, a via parenteral consiste na injeção de medicamentos nas vias intramuscular, endovenosa, auricular, intradérmica ou subcutânea.
- III Ao se utilizar a via subcutânea para administrar medicamento, não se deve aplicá-lo nas proximidades da cintura pélvica ou das articulações e na região genital.
- IV Certas vacinas, como a antirrábica, ou drogas, como insulina, adrenalina e heparina, têm indicação para via subcutânea, também chamada hipodérmica.
- V A via subcutânea é indicada para drogas irritantes ou quando se quer obter absorção ou ação imediata do medicamento.

Estão certos apenas os itens:

- (A) I, II e IV;
- (B) I, II, e V;
- (C) I, III e IV;
- (D) II, III e V;
- (E) III, IV e V.



8 - Ao verificar o resíduo gástrico em um recém-nascido (RN) com alimentação por gavagem, obteve-se o valor de 4 ml. O volume total da dieta oferecida em horário anterior foi de 10 ml. Quanto deve ser oferecido nesse novo horário?

- (A) 10 ml;
- (B) 7 ml;
- (C) 0 ml;
- (D) 8 ml;
- (E) 6 ml.

9 - Hiponatremia no recém-nascido em UTI neonatal quer dizer perda de um tipo de eletrólito.

Identifique abaixo o tipo de eletrólito e a intervenção indicada, respectivamente.

- (A) Potássio/realização de eletrocardiograma;
- (B) Sódio/reposição hídrica com soro fisiológico;
- (C) Glicose/administração de solução hipertônica a 50%;
- (D) Hemácias/hemotransfusão;
- (E) Cloro/infusão de soro fisiológico a 0,9%.

10 - É considerada desnutrida a criança cujo percentil idade-peso esteja abaixo de:

- (A) 0,1;
- (B) 3;
- (C) 10;
- (D) 50;
- (E) 97.

11 - Quanto ao processo de cicatrização das feridas é correto afirmar que:

- (A) A cicatrização por primeira intenção caracteriza-se por lesões com bordas regulares e de ajustes por suturas, com perda acentuada de tecido.
- (B) A cicatrização das feridas com área externa de necrose, de coagulação ou de coloração negra ocorrerá com uso contínuo de antisséptico prescrito.
- (C) A oxigenação e a perfusão dos tecidos são condições essenciais para ocorrer a cicatrização das feridas.
- (D) As feridas abertas devem ser mantidas secas e limpas por meio de coberturas adequadas. Assim haverá aumento de migração celular, que favorece a epitelização.
- (E) A deficiência protéica não influencia a resposta imunológica, mas baixas taxas de vitamina A tornam as feridas mais susceptíveis às infecções.

12 - Artigos hospitalares que entram em contato com pele não íntegra ou com mucosas íntegras do paciente são denominados:

- (A) Artigos não críticos;
- (B) Artigos semicríticos;
- (C) Artigos críticos;
- (D) Artigos contaminados;
- (E) Artigos reutilizados.



13 - Acerca do tratamento insulínico do diabetes melito, assinale a opção INCORRETA:

- (A) A insulina simples ou regular é indicada no tratamento da cetoacidose, durante certas intercorrências, como cirurgia, infecção proveniente de traumatismo, ou sempre que houver necessidade de um controle mais rápido de glicemia.
- (B) A lipodistrofia é uma complicação do tratamento com insulina, que ocorre no local das injeções de insulina.
- (C) A insulinoterapia é a injeção subcutânea de insulina, de ação curta ou intermediária. Em casos de urgência, tanto a insulina NPH quanto a insulina regular podem ser administradas por via endovenosa.
- (D) No diabetes do tipo 1, o corpo perde a capacidade de produzir insulina, portanto a insulina exógena deve ser administrada indefinidamente.
- (E) Nos casos de manifestação alérgica local após o uso de insulina, não se deve interromper o tratamento insulínico; são indicados apenas antialérgicos comuns.

14 - Nos acidentes com picadas de cobras, o início da administração do soro antiofídico deve ocorrer nas primeiras:

- (A) 3 horas;
- (B) 6 horas;
- (C) 12 horas;
- (D) 22 horas;
- (E) 24 horas.

15 - Quanto aos cuidados com o paciente cirúrgico, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Quanto maior o intervalo entre tricotomia e o ato operatório, maior será o risco de infecção na ferida operatória.
- (B) O paciente deve ser orientado a esvaziar a bexiga antes de ser levado ao centro cirúrgico.
- (C) A posição de litotomia está indicada para as cirurgias pélvicas e laparotomias.
- (D) Cabe ao instrumentador assegurar-se de que todas as agulhas, compressas e instrumentais foram retirados do paciente ao final da cirurgia.
- (E) É função da circulante checar os equipamentos e a disponibilidade dos materiais, antes e durante a cirurgia.

16 - Acerca da esterilização de material, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Na prática de empacotamento com esterilização a vapor saturado, recomenda-se que os pacotes estejam compactados de forma a permitir a penetração do vapor e evitar a entrada de ar no interior deles, o que poderia provocar recontaminação.
- (B) É finalidade de uma central de esterilização padronizar técnicas de limpeza, preparo, empacotamento e esterilização, assegurando economia de pessoal, material e tempo.
- (C) Após o processo de limpeza, os instrumentos podem apresentar rigidez e dificuldade de manejo. A lubrificação do material cirúrgico é particularmente importante após a limpeza e antes do ciclo de esterilização. São produtos recomendados para lubrificar os instrumentais o óleo mineral, o óleo de silicone ou o óleo de máquinas.
- (D) Os instrumentais cirúrgicos materiais que o vapor tem contato com apenas a superfície dos artigos a serem esterilizados, sem penetração pelas estruturas da matéria-prima constituinte, são definidos como material de superfície.
- (E) Os indicadores químicos são produtos de natureza química que monitoram um ou mais parâmetros da esterilização, com a finalidade de controlar a exposição interna e externa do pacote.



17 - O acompanhamento da gestação mediante consultas de pré-natal é uma estratégia que visa identificar e tratar as intercorrências que possam afetar a mulher e o feto. Em cada consulta do pré-natal, é importante que seja verificado o peso da gestante, sendo o objetivo desse cuidado:

- (A) Controlar o ganho de peso, pois a gestante necessita ganhar 2 kg a cada mês.
- (B) Acompanhar o peso, pois o ganho excessivo é sinal da Doença Hipertensiva Específica da Gravidez.
- (C) Monitorar a evolução da gestação, pois ganhos menores de 18 kg geram feto com baixo peso.
- (D) Avaliar indiretamente a pressão arterial, pois o peso é um bom identificador.
- (E) Identificar o risco de parto pós-termo, que está relacionado à diminuição do peso corporal.

18 - É um exemplo de método anticoncepcional hormonal, de barreira, definitivo e natural, respectivamente:

- (A) Pílula, diafragma, vasectomia e Billings;
- (B) DIU, preservativo feminino, Billings e tabelinha;
- (C) Pílula, laqueadura, preservativo masculino e coito interrompido;
- (D) Vasectomia, pílula, Billings e tabelinha;
- (E) Pílula, preservativo masculino, DIU e tabelinha.

19 - São sinais que indicam o início do trabalho de parto:

- I Perda de líquido amniótico;
- II Secreção esbranquiçada;
- III Hipotensão arterial;
- IV Contrações dolorosas com certa regularidade;
- V Apagamento e ou dilatação do colo;
- VI Secreção sanguinolenta.

Estão corretos os sinais:

- (A) II, III e IV, apenas;
- (B) II, III e VI, apenas;
- (C) I, II, IV e V, apenas;
- (D) I, III, V e VI, apenas;
- (E) I, IV, V e VI, apenas.

20 - Acerca do câncer de mama, cuja incidência tem crescido bastante nos últimos anos, julgue os itens abaixo:

- I Os hormônios esteróides produzidos pelos ovários têm papel importante no câncer de mama.
- II A menarca e a menopausa tardia aumentam o risco de desenvolvimento de câncer de mama.
- III É mais comum a incidência de câncer na mama esquerda, e, em geral, as lesões são sensíveis em vez de dolorosas.
- IV Caso o câncer de mama tenha se desenvolvido durante a gestação, o tratamento é semelhante ao de outras mulheres, em todas as formas desse câncer.
- V Nas mastectomias em que ocorre a retirada dos nódulos axilares, a movimentação e os exercícios com o braço do lado afetado devem ser evitados.

Estão certos apenas os itens:

- (A) I e II;
- (B) I e III;
- (C) II e IV;
- (D) III e V;
- (E) IV e V.



21 - No acompanhamento pré-natal, é imprescindível ao enfermeiro conhecer que:

- (A) Diminuição da frequência cardíaca materna em 10 a 15 bat/min. No final da gestação associa-se à embrição gravídica dos tecidos e a expansão do leito vascular uterino.
- (B) O sofrimento fetal associa-se aos casos em que os menores valores da hemoglobina decorrem da anemia materna por deficiência de ácido fólico.
- (C) A infecção genito-urinária sintomática, decorrente de má higiene genital materna, associa-se à maior probabilidade de doença hipertensiva específica da gravidez.
- (D) O edema que se manifesta na gestante logo ao acordar, quando não acompanhado de aumento súbito de peso, é considerado fisiológico.
- (E) A elevação de 15mmHg na pressão sistólica em relação aos níveis tensionais pré-gravídicos determina estado hipertensivo e conseqüente sofrimento fetal.

22 - O hormônio, envolvido no ciclo reprodutivo, que atua na motilidade da musculatura uterina, auxilia no transporte dos espermatozoides pelo útero ao oviduto e aumenta a resposta miométrial por ocasião do parto, é:

- (A) A ocitocina;
- (B) O luteinizante;
- (C) A gonadotropina coriônica;
- (D) O folículo estimulante;
- (E) A prostaglandina.

23 - É súbita ou insidiosa a instalação dos sintomas da dengue, e o enfermeiro deve estar alerta à manifestação da dengue hemorrágica e da contra-indicação dos salicilatos. Sobre a dengue, podemos afirmar que:

- (1) Na síndrome de choque da dengue, um achado importante é a trombocitopenia com hemoconcentração concomitante.
- (2) A prova do laço é utilizada com exame clínico, como diagnóstico na dengue clássica.
- (3) O teste Mac-Elisa, que necessita de três amostras, é considerado falho, pela vigilância epidemiológica.
- (4) O tratamento é sintomático e compreende a administração de antitérmico, analgésico e antiemético.

Estão corretas apenas:

- (A) 2 e 3;
- (B) 1, 2 e 3;
- (C) 1, 3 e 4;
- (D) 1 e 2;
- (E) 1 e 4.

24 - A maioria das vacinas ainda é administrada por via parenteral, o que implica uma série de dificuldades operacionais. Em relação à aplicação de vacina por via parenteral, assinale a alternativa correta.

- (A) O local padronizado para a aplicação da vacina BCG é correspondente ao terço médio do antebraço direito.
- (B) A via subcutânea é utilizada para a aplicação das vacinas DPT, DT, dT que devem ser introduzidas no músculo deltóide.
- (C) Durante as aplicações, o relaxar do músculo demonstrou ser capaz de aumentar a dor e o desconforto da injeção.
- (D) Após introduzir a agulha, ao utilizar a via intramuscular, aspira-se para se assegurar de que a agulha não tenha sido inserida em um vaso.
- (E) O volume máximo que pode ser administrado com segurança, por via intramuscular, não deve exceder os 6ml em crianças.



25 - A vacina BCG, que previne contra as formas mais graves de Tuberculose, deve ser feita ao nascer ou na primeira visita do recém-nascido à unidade de saúde. A dose e a via de administração dessa vacina são, respectivamente:

- (A) 0,1 ml e via intradérmica;
- (B) 0,1 ml e via subcutânea;
- (C) 1,0 ml e via intradérmica;
- (D) 1,0 ml e via subcutânea;
- (E) 0,5 ml e via subcutânea.

26 - Alguns eventos adversos são observados depois da administração de algumas vacinas. No entanto, as manifestações que ocorrem são geralmente benignas e transitórias. Das reações abaixo, qual contraindica a administração das doses subsequentes da vacina DTP, devido ao componente pertusis?

- (A) Choro persistente e incontrolável, durante 3 horas ou mais, ocorrendo nas primeiras 48 horas após a vacinação DTP;
- (B) Convulsões nas primeiras 72 horas após a vacinação DTP;
- (C) Encefalopatia, nos primeiros 7 dias após a vacinação DTP;
- (D) Temperatura igual ou superior a 39,5°C, sem outra causa identificável, nas primeiras 48 horas após a vacinação DTP;
- (E) Episódio hipotônico-hiporresponsivo, nas primeiras 48 horas após a aplicação da vacina DTP.

27 - A vacina preconizada pelo Programa Nacional de Imunização, que está indicada para ser feita preferencialmente ao nascer, com a finalidade de evitar a transmissão vertical é:

- (A) BCG;
- (B) DPT;
- (C) Hepatite A;
- (D) Hepatite B;
- (E) Hib.

28 - A gripe é uma doença viral aguda que, previsível e periodicamente, causa epidemias em todo o mundo. A vacinação promove a profilaxia de algumas complicações, entre as quais:

- (A) Bronquites e asma;
- (B) Bronquites e pneumonias bacterianas;
- (C) Asmas e pneumonias virais;
- (D) Pneumonias virais ou bacterianas;
- (E) Endocardites e bronquites.

29 - As características importantes do bioagente patogênico na cadeia epidemiológica são:

- (A) Infectividade, patogenicidade, virulência e imunicidade;
- (B) Infectividade, transmissibilidade, imunicidade e mortalidade;
- (C) Infectividade, mortalidade, morbidade e imunicidade;
- (D) Transmissibilidade, mortalidade, morbidade e imunicidade;
- (E) Transmissibilidade, mortalidade, morbidade e virulência.

30 - Para ter eficácia, a vacina antipólio oral deve ser conservada em nível local, numa temperatura entre:

- (A) +1 e +6°C;
- (B) +3 e +5°C;
- (C) -2 e +1°C;
- (D) 0 e +4°C;
- (E) +2 e +8°.